



7. Anti-resistentie strategieën

Om de kans op resistentievorming van de vogelmijten tegen de gebruikte middelen te verminderen, zullen de gebruikte middelen:

- elkaar voldoende moeten afwisselen;
- moeten roteren of misschien;
- met meerdere gelijktijdig moeten worden toegediend.

Ad a. In de beschrijving van de toegelaten middelen staat vermeld hoe vaak het middel per legronde mag worden gebruikt. Dit maximaal toegelaten aantal bestrijdingen is opgesteld om een zo lang mogelijke effectiviteit van het middel te bewerkstelligen. Houd u dan ook aan dit maximale aantal bestrijdingen.

Ad b. De middelen die afwisselend gebruikt worden moeten een ander werkingsmechanisme hebben. Vraag dit na bij uw productleverancier of dierenarts.

Ad c. Middelen die met elkaar gecombineerd worden, moeten wel met elkaar verenigbaar zijn. De concentraties zullen altijd volgens het advies moeten worden toegediend.

8. Evaluatie

Na het toepassen van een bestrijdingsmethode/-middel wordt de effectiviteit ervan vastgesteld met behulp van monitoring; stap 8 van IPM voor vogelmijt "Evaluatie". Bij gebleken ineffectiviteit zal, om kosten- en milieutechnische redenen, een andere methode moeten worden ingezet, tenzij de leverancier van het product aangeeft dat de effecten van een bestrijding pas op de langere termijn te verwachten zijn.